
CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ “ADOLF HAIMOVICI”

Profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului

Profilul real specializarea stiințele naturii

Profilul tehnic

Etapa locală, 17 februarie 2018

Clasa a XII-a

Subiectul 1 (7 puncte)

- a) Să se rezolve ecuația $\hat{3}x + \hat{3} = \hat{0}$ cu coeficienți în \mathbb{Z}_{12} .
 b) Pe \mathbb{R} se definește legea de compozitie $x * y = 2xy - 6x - 6y + 21$.

Să se calculeze $\underbrace{x * x * \dots * x}_{n\text{-ori}}$ unde $x \in \mathbb{R}$ și $n \in \mathbb{N}^*$.

Barem

- a) $\hat{3}x = -\hat{3} \Rightarrow \hat{3}x = \hat{9} \Rightarrow x \in \{\hat{3}, \hat{7}, \hat{11}\}$ 3p
 b) Aduce legea sub forma $x * y = 2(x - 3)(y - 3) + 3$ 1p

$$x * x = 2(x - 3)(x - 3) + 3 = 2(x - 3)^2 + 3$$

$$x * x * x = [2(x - 3)^2 + 3] * x = 2 \cdot [2(x - 3)^2 + 3 - 3] \cdot (x - 3) + 3 = 2^2(x - 3)^3 + 3$$

Intuiesc $x * x * \dots * x = 2^{n-1}(x - 3)^n + 3$, dacă x este de n ori. 2p

Demonstrez prin inductie propozitia $P(n)$: $x * x * \dots * x = 2^{n-1}(x-3)^n + 3$ 1p

$$\text{Fie } a \in \mathbb{R}, G = \left\{ A(t) = \begin{pmatrix} 1 & t & at^2 + 2t \\ 0 & 1 & 4t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

**Subiectul 3 (7 puncte)**

Să se calculeze:

- a) $I = \int \frac{\sin x}{e^x + \sin x + \cos x} dx$ și $J = \int \frac{\cos x + e^x}{e^x + \sin x + \cos x} dx$, unde $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$;
- b) $\int \frac{1}{e^x + a} dx$, $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$;
- c) $\int \frac{2}{(e^x + 1)(e^x + 3)} dx$.

Barem

a) $I+J=\int dx = x + C$ 1p
 $J - I = \int \frac{\cos x + e^x - \sin x}{e^x + \sin x + \cos x} dx = \ln(e^x + \sin x + \cos x) + C$ 1p

Rezolvă sistemul și obține:

$I = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln(e^x + \sin x + \cos x) + C$, $J = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln(e^x + \sin x + \cos x) + C$ 1p

b) $\int \frac{1}{e^x + a} dx = \int \frac{1}{e^x(e^x + a)} \cdot e^x dx$. Facem substituția $e^x = t$, atunci $e^x dx = dt$.

$\int \frac{1}{t(t+a)} \cdot dt = \frac{1}{a} \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+a}\right) dt = \frac{1}{a} \ln\left(\frac{t}{t+a}\right) + C$ 1p

$I = \frac{1}{a} \ln \frac{e^x}{e^x + a} + C$ 1p

c) $\int \frac{2}{(e^x + 1)(e^x + 3)} dx = \int \frac{(e^x + 3) - (e^x + 1)}{(e^x + 1)(e^x + 3)} dx =$ 1p

$= \int \frac{1}{e^x + 1} dx - \int \frac{1}{e^x + 3} dx = \ln \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{1}{3} \ln \frac{e^x}{e^x + 3} + C$ 1p

Subiectul 4 (7 puncte)

Se dă funcția $g: [1, e] \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = \ln^4 x$.

- a) Determinați numerele a, b, c, d astfel încât funcția $G: [1, e] \rightarrow \mathbf{R}$, $G(x) = x(\ln^4 x + a \ln^3 x + b \ln^2 x + c \ln x + d)$ să fie o primitivă a lui g.
- b) Dacă $h: [1, e] \rightarrow \mathbf{R}$, $h(x) = \frac{g(x)}{x}$, găsiți primitiva H a funcției h care să aibă proprietatea $H(e^2) = \frac{2}{5}$.

**Barem**

- a) G derivabilă pe $[1,e]$ și $G'(x) = g(x)$1p
 $G'(x)$2p
 $a=-4, b=12, c=-24, d=24$1p
- b) Determinarea primitivelor $H(x)$1p
 $H(e^2)$1p
 $C= - 6$ și finalizarea.....1p